

Dénomination du médicament

DROSETUX, sirop

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DROSETUX, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DROSETUX, sirop ?
3. Comment prendre DROSETUX, sirop ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DROSETUX, sirop ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DROSETUX, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

Ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé dans le traitement des toux sèches, d'irritation et dans les toux non productives gênantes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DROSETUX, sirop ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DROSETUX, sirop :

Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et DROSETUX, sirop

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

DROSETUX, sirop avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Compte tenu des données disponibles, l'utilisation de DROSETUX, sirop est possible chez la femme enceinte ou allaitant.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

DROSETUX, sirop contient du saccharose, du benzoate de sodium (E211) et du sodium.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient 2,1 g, 4,2 g ou 12,6 g de saccharose par dose de 2,5, 5 ou 15 ml respectivement. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré.

Ce médicament contient de 5,5 mg d'acide benzoïque pour une dose de 2,5 ml, 11,1 mg d'acide benzoïque pour une dose de 5 ml et 33,3 mg d'acide benzoïque pour une dose de 15 ml de sirop. Le benzoate de sodium peut accroître le risque ictère (jaunissement de la peau et des yeux) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose de 2,5 ml, 5 ml et 15 ml, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE DROSETUX, sirop?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 30 mois sans avis médical.

Dès l'apparition des premiers symptômes de toux sèche d'irritation et de toux non productive gênante :

Adulte : prendre une dose de 15 ml à l'aide du godet doseur 2 à 3 fois par jour.

Enfant à partir de 5 ans : prendre 1 dose de 5 ml à l'aide du godet doseur 3 à 5 fois par jour.

Enfant de moins de 5 ans : prendre 1 dose de 2,5 ml à l'aide du godet doseur 3 à 4 fois par jour.

Fréquence d'administration

Les prises doivent être réparties au cours de la journée, de préférence en dehors des repas.

Espacez les prises dès amélioration.

Cessez les prises dès la disparition des symptômes.

Durée du traitement

La durée du traitement est de 5 jours. En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours, consultez un médecin.

Si vous avez pris plus de DROSETUX, sirop que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DROSETUX, sirop

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre DROSETUX, sirop

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DROSETUX, sirop ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne prenez pas DROSETUX, sirop après la date de péremption indiquée sur la boîte.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas conserver au-delà de 1 an après ouverture.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DROSETUX, sirop

- Les substances actives sont :

Arnica montana 4 CH.....	0,1 g
Belladonna 4 CH.....	0,1 g
Cina 4 CH.....	0,1 g
Coccus cacti 5 CH.....	0,1 g
Corallium rubrum 4 CH.....	0,1 g
Cuprum metallicum 5 CH.....	0,1g
Drosera 4 CH.....	0,1 g
Ferrum phosphoricum 5 CH.....	0,1 g
Ipeca 4 CH.....	0,1 g
Solidago virga aurea 3 DH.....	0,1 g

Pour 100 g de sirop

- Les autres composants sont :

Solution de saccharose, benzoate de sodium (E211), acide citrique monohydraté (E330), eau purifiée.

Qu'est-ce que DROSETUX, sirop et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de sirop.

Une boîte contient un flacon de 150 ml avec ou sans verseur anti gouttes et un godet doseur (15 ml) gradué à 2,5 ml, à 5 ml et à 15 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Fabricant**BOIRON**

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).