

Oligosol

Manganèse
Cuivre
Cobalt

Composition
pour une ampoule de 2 ml
GLUCONATE DE MANGANÈSE 0,590 mg
GLUCONATE DE CUIVRE 0,518 mg
GLUCONATE DE COBALT 0,553 mg
Excipient à effet notoire : glucose. Autre excipient : eau purifiée.

côté à ouvrir 

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable en ampoule de 2 ml, boîte de 14.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE : OLIGOTHÉRAPIE (V : divers)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états asthéniques.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant : antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

RÉSERVÉ À L'ADULTE.

Posologie : 1 à 2 ampoules par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

L'administration par voie sublinguale est recommandée.

Les ampoules sont à prendre :

- de préférence le matin à jeun,
 - éventuellement 15 minutes avant un repas ou le soir au coucher.
- Garder le contenu de l'ampoule 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

Posologie



matin



midi



soir

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS. SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur ce conditionnement. À conserver à une température inférieure à 25° C.

Date de révision de la notice : Janvier 1998.

LOT : 7466/1
EXP : JUN 16



NE PAS LAISSER À LA PORTÉE
NI À LA VUE DES ENFANTS.
MÉDICAMENT AUTORISÉ N° 3400930751800.



* 3 0 7 5 1 8 0 *