

GEL RECTOPANBILINE

MEDA

GEL RECTAL



6 RÉCIPIENTS UNIDOSES

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) **DÉNOMINATION**
GEL RECTOPANBILINE
GEL RECTAL

Réceptifs unidoses

b) **COMPOSITION QUALITATIVE**

Extrait de bile de boeuf.

COMPOSITION QUANTITATIVE

Extrait de bile de boeuf 0,0975 g

Excipients: gélatine, glycérol, eau.

Pour un réceptif unidosé de 6,5 g.

c) **FORME PHARMACEUTIQUE**

Réceptifs unidoses avec canule rectale.

d) **CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE**

Laxatif - Sels biliaires. (A: Appareil digestif et métabolisme).

e) **NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT**

Fabricant: MEDA Manufacturing

Exploitant: MEDA Pharma

Avenue J. F. Kennedy

33 700 MERIGNAC FRANCE

2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce médicament est préconisé dans certaines constipations: constipations basses, notamment par dyschésie rectale (défécation difficile, quelle qu'en soit la cause) et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

3. ATTENTION

a) **DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT**
(CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ** dans les cas suivants:

- chez l'enfant de moins de douze ans sans la prescription d'un médecin.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) **MISES EN GARDE SPÉCIALES**

Constipation occasionnelle:

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée):

Elle peut être liée à deux causes:

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres:

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruit ...)
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits.
- une augmentation des activités physiques (sport, marche ...)
- une rééducation du réflexe de défécation.
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Cas particulier de l'enfant:

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique: notamment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de laits infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits. Le traitement par un laxatif par voie rectale sans avis médical est contre-indiqué (la prise régulière peut entraver le fonctionnement normal du réflexe de défécation).

c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament en cas de crise hémorroïdaire, de fissure anale et de rectocolite hémorragique (maladie caractérisée par l'érosion de la muqueuse du rectum et du côlon, avec saignements et parfois suppuration).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

NE PAS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT

Prévenez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT**a) POSOLOGIE**

La posologie est en moyenne de 1 à 2 doses par jour.

b) MODÈ ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie rectale quelques minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS**(EFFETS INDÉSIRABLES)**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS:

- Sensation de brûlures anales.

- Exceptionnellement: rectites congestives (inflammation du rectum).

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE:

Mai 2006